

Ueber den Werth und die Gefahren des
Chloroform in der Chirurgie.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

von

Herrn Geheimrath und Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s.

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Joseph Tischler

approb. Arzte aus Landshut.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber den Werth und die Gefahren des
Chloroform in der Chirurgie.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

von

Herrn Geheimrath und Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s.

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Joseph Tischler

approb. Ärzte aus Landshut.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Verfolgen wir die Geschichte der Chirurgie, so sehen wir deutlich zu allen Zeiten das Streben, die mit den Operationen unvermeidlich verbundenen Schmerzen zu beseitigen oder möglichst zu mildern.

Jahrhunderte hindurch blieb der Erfolg in dieser Beziehung ein wenig lohnender, bis 1846 Morton in Boston die bahnbrechende Entdeckung machte, daß Aether inhalirt narcotifire und bis endlich 1847 Simpson zu Edinburg die gleiche Wirkung vom Chloroform nachwies. Jahre vergingen wiederum über dem Prüfen, welchem von beiden Narcoticis der Vortritt auf Grund möglichst zahlreicher, vergleichender Versuche eingeräumt werden sollte, bis schliesslich allgemein das Chloroform zur Geltung und Einführung kam, indem es durch die Promptheit seiner Wirkung, seine einfache Anwendung und die Geringfügigkeit der Nachleiden den Sieg über den Aether errang und heut' zu Tage noch seinen ersten Platz behauptet.

Die kolossale Verbreitung des Chloroform und die dadurch allbekannten Vortheile desselben gestatten mir, mich über seinen Werth in aller Kürze zu fassen.

Seinen Werth verdankt es eben einzelnen bei der Inhalation auftretenden Wirkungen, nämlich: dem während der Narcofe allmählich völligem Erlöschen der Sensibilität

und des Bewußtfeins und der Erschlaffung der willkürlichen Muskulatur. *)

*) Die physiologische Wirkung des Chloroform ist noch in Dunkel gehüllt und schwebt noch im Bereiche der Hypothese:

Zwei getrennte Lager bilden die Forscher, welche sich bemühen, durch Thierexperimente über die Wirkung des Chloroform eine Erklärung für die Symptome zu geben, indem die einen glauben, es handle sich lediglich um eine vorübergehende Veränderung des Blutes resp. der rothen Blutkörperchen, die andern hingegen dem Blute nur eine vermittelnde Rolle einräumen, indem sie sagen: Das Chloroform kommt mit dem kreisenden Blute zu den nervösen Centralorganen und da wirkt es direct ein.

Letztere sind eben der Ansicht, daß das »Chloroform bei seiner gewöhnlichen Verabreichung weder das kreisende Blut, noch die lebendige Muskulatur, auch nicht die des Herzens anzugreifen im Stande ist, anderseits aber auch die Körperbestandtheile nicht vermögen, das durch die Lungen, intestinal und subcutan eingeführte Mittel in seiner chemischen Constitution zu beeinflussen, wie aus dem bisher negativ ausgefallenen Streben, Umwandlungsprodukte desselben im Organismus oder dessen Excreten nachzuweisen, hervorgeht, und sie suchen darum die nächste Ursache der Narcose allein darin, daß die nach bestimmten physikalischen Gesetzen in's Blut übertretenden Chloroformdämpfe als solche direct nur auf gewisse nervöse Centralapparate einwirken.«

Flourens und Bernstein haben darüber experimentirt:

Flourens kommt dabei, indem er aus dem Schwinden des Bewußtfeins und dem taumelnden Gang der halbchloroformirten Thiere seinen Schluss zieht, zu der Ansicht, daß zunächst die Thätigkeit der großen Hirnlappen (Sitz der Intelligenz und des Bewußtfeins) dann des Kleinhirns (Sitz des Gleichgewichtes) dann des Rückenmarkes, das zunächst der Empfindung, dann der Motilität beraubt wird, aufgehoben wird, während die Medulla oblongata am längsten functionirt; erlöschet auch sie, ist auch das Leben erloschen.

Bernstein kommt auf seinen zahlreichen Rückenmarksdurchschneidungen zu dem Resultat: Angriffspunkt des Narcoticum ist die Ganglienzelle und zwar zuerst die sensible, später die motorische; die Nervenfasern selber zeigen keinerlei Funktionsstörungen, sie behalten ihre normale Erregbarkeit.

»Die Art und Weise der Einwirkung ist wie für die meisten Nervengifte auch für das Chloroform unbekannt, jedenfalls wird man sie als eine nur äußerst flüchtige Contactwirkung physikalischer oder chemischer Natur aufzufassen haben, wie aus dem relativ schnellen Ablauf auch der tiefsten Narcose und aus der vollkommenen Restitution nach derselben geschlossen werden darf.«

Als Hauptvertreter der Gegenansicht, daß die Formveränderung des Blutes die Narcose bedinge, sind Hüter und Witte zu nennen.

Ausgehend von der Thatfache, daß Chloroform Blut außerhalb des Organismus verändert, indem die Blutkörperchen bei mäßiger Chloroformeinwirkung

Jedermann kennt die Furcht und Angst mit ihrer eingreifenden Bedeutung für die Psyche, die den Patienten erfasst beim Gedanken, sich einer Operation unterziehen zu müssen, sei es dass er gemäß seines Bildungsgrades vor dem Schmerz

aufquellen und ihnen Zacken anschießen, bei stärkerer sich auflösen, beobachteten Hüter und Witte das Blut mit feinen Veränderungen innerhalb des Organismus bei Chloroformeinwirkung durch folgendes Experiment:

Sie legten auf den Grund eines gewöhnlichen Reagenzglases ein wenig mit Chloroform getränkte Watte, so dass die Chloroformdämpfe den Raum des Glases anfüllten. In das Glas nun hingen sie den Schenkel eines Frosches, so dass der Oberschenkel die Oeffnung des Glases ausfüllte. In wenigen Minuten war der Frosch total anaesthetisiert, also durch die Hautgefäße des einen Beins chloroformirt worden. (Hüter gelang es durch Chloroformeinwirkung auf die Beine selbst Lämmer zu narcotisieren). Macroscopisch zeigte sich Röthung der Haut, mikroskopisch, dass diese Röthung nicht von einer einfachen Dilatation der Gefäße herrührte, sondern dass die Gefäße mit ruhendem Blut und dicht zu Ballen zusammengepressten Blutkörperchen gefüllt und dilatirt waren; es bestand somit eine Stase in den Capillaren, bedingt durch die vermöge ihrer veränderten Form (18—20 trommelflechlegelähnliche Fortsätze) schwer die Capillaren passirenden Blutkörperchen: nach Hüter globulöse Stase genannt. Dass diese Stasen leicht zur Lösung und die zusammengeballten Blutkörperchen fortgerissen werden, bewies die mikroskopische Untersuchung der Zungencapillaren des Frosches, wo sie äußerst zahlreich gefunden wurden und somit ist auch die globulöse Embolie nachgewiesen. Demnach sind Hüter und seine Anhänger geneigt das Wesen der Narcose in der globulösen Embolie der Capillaren der nervösen Centralorgane zu suchen.

»Die Chloroformdämpfe werden eingeathmet in die Lungenalveolen, wirken hier durch die einfache Epitheldecke und die Capillarwand sicherer und bedeutend leichter auf das strömende Blut ein als durch das geschichtete Lager der Epidermiszellen des Frosches. Die formveränderten Blutkörperchen kommen bei Lösung der Capillarstase in das linke Herz und werden von seiner Contraction in die Capillaren des großen Kreislaufes, also auch in die Capillaren des Gehirns getragen.«

Max Schüller hat durch seine Experimente den directen Nachweis geliefert, dass unter Chloroformeinwirkung ausgedehnte Stasen in den Arterien der Pia sich finden.

Hüter wies durch Cheiloangioskopie an frisch aus der Narkose Erwachten die globulösen Stasen in der Schleimhaut der Unterlippe nach.

Für Hüter spricht schließlich auch noch das empirische Mittel der Inversion, das schon oft bei Chloroformsyncopen sowie Ohnmachten, durch acute Hirnanaemie bedingt, sich bewährt hat. Die Anaemie wird aufgehoben, indem das Blut zu den Hirngefäßen befördert wird durch die mit der Inversion ver-

zurückbebt, der ihn erwartet, oder sei es, daß er die Folgen überdenkt und deshalb sich seiner jene so nachtheilig wirkende, schreckliche Beforgnis bemächtigt.

Das Chloroform hilft Beiden: Hoffnungsvoll und voll Vertrauen sieht der Kranke der blutigen Operation entgegen, denn ihre Schrecknisse bleiben ihm verborgen, ein Traumbild tritt vor seine Seele und das Erwachen ist ein Erwachen zur Genesung. Die Furcht, die so oft ihre erschöpfende Wirkung auf die Lebenskräfte gezeigt, existirt fast nicht mehr.

Wer die Folgen ängstlich erwägt, auch dem leistet das Chloroform seine Dienste; er weiß ja, daß er nicht durch Unruhe und Klagen dem Werke des Arztes hemmend entgegentritt; Ruhe und Stille ermöglichen dem Operateur seine volle Aufmerksamkeit der Technik zuzuwenden, das Selbstvertrauen für das Gelingen wächst beim Arzte, mit größerer Leichtigkeit schreitet sein Werk der Vollendung entgegen.

Wie für die Operation hat das Chloroform auch für die Sicherstellung der Diagnose seine Vortheile: Mangel an Schmerz gestattet eine gründliche Untersuchung, nach jeder Richtung kann der Arzt sich Gewissheit verschaffen, die so wichtig für sein nachträgliches Eingreifen, beseitigt ist die oft all' zu große und übermäßige Schamhaftigkeit, die Seitens des weiblichen Geschlechts nicht selten dem Arzte störend in den Weg tritt.*)

bundene mechanische Erleichterung für das Herz. Bei der Chloroformsyncope erklärt die Theorie im Sinne Hüters die glückliche Wendung so: Auch bei der Chloroformnarcose kommt der Druck zwischen dem Herzen und dem von der globulösen Staße am meisten ergriffene Capillarbezirk der Herzkraft zu Hilfe, um die hastenden rothen Blutkörperchen aus den Capillaren in die Venen zu treiben; deshalb bringt die Inversion die Stafen im Gehirn zur Lösung.

Auf Grund der erwähnten Thatfachen läßt sich annehmen, daß »die psychischen Alterationen des chloroformirten Menschen durch die ähnliche Veränderung der Gefäßfüllung ihre Erklärung finden, da unzweifelhaft mit denselben bedeutende Ernährungsstörungen der Ganglien der Großhirnrinde Hand in Hand gehen.

*) Bezüglich der Diagnose: Simulation ist dagegen »die Chloroformanaesthesia z. B. bei Contracturen, Ankylosen, Paralyfen, Stottern nicht zuver-

Fassen wir darum die Wirkung des Chloroform in dieser Richtung zusammen, dessen Werth in gleichem Verhältniß mit der Schmerzhaftigkeit steigt, das uns die so oft verderblich gewesene psychische Depression beseitigt, so müssen wir sagen: Dem Chirurgen leistet das Chloroform die grössten Dienste und aus voller Ueberzeugung uns v. Nufsbaum anschliessen, wenn er schreibt, »dafs diese grofsartigen Operationen, viele Errungenschaften der letzten 20 Jahre nie geboren worden wären, hätte nicht die Erfindung einer vollkommenen Anaesthesie dem Chirurgen ein enormes Material und den Muth zu complicirteren Eingriffen gebracht.«

Von nicht geringer Bedeutung für viele chirurgische Operationen ist auch die andere Wirkung des Chloroform, nämlich die Erschlaffung der Muskulatur.

In erster Linie seien die vortheilhaften Folgen bei der Taxis erwähnt: der Patient leistet keinen activen Widerstand, die durch den Schmerz reflectorisch contrahirten Bauchmuskeln erschlaffen, der Finger des Chirurgen erreicht die oft tief gelegene Einklemmungsstelle; hat die in der Chloroformnarkose versuchte energische Taxis keinen Erfolg, so ist dadurch eine berechtigte Indication für die Herniotomie gewonnen.

Bei Prolapsus recti kann durch die Erschlaffung die allenfallsige Durchschneidung überflüssig werden.

Bei Fracturen mit verschobenen Bruchenden wird die Einrichtung mit weit geringerem Kraftaufwand möglich, ebenso bei Luxationen die Reposition; bei letztern ist ferner

lässig, da während der Narkose Manches möglich ist, was ausser derselben mit dem besten Willen nicht bewerkstelligt werden kann.

v. Nufsbaum hat sich vielfach überzeugt, dafs Ankylosen, welche er und die Patienten für vollkommene hielten, in der Narkose grofse Beweglichkeit zeigten; dafs Contracturen an der Wirbelsäule, am Becken, an den Wadenmuskeln, welche die Kranken beim vollsten Bewusstsein und mit grösster Mühe nicht verändern konnten, in der Chloroformnarkose ganz verschwanden.«

mit der Chloroformanwendung der Vorthail verbunden, daß die consecutiven Krankheits Symptome fehlen, welche bei Repositionen ohne Narcofe so häufig find und darin bestehen, daß die Gelenke längere Zeit Sitz einer entzündlichen und oft intensiv schmerzenden Anschwellung bleiben und in der durch die Reposition erfolgten Zerreißung der Muskeln ihre Erklärung finden.

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

Dieser alte Satz ist eine goldene Richtschnur für Alle, die das Chloroform oft anwenden müssen, denn: Sind die Vorthteile der Chloroformnarkose anerkanntermaßen auch außerordentlich groß, das Chloroform hat auch seine Schattenseiten, wie sein Werth, so liegen auch seine Gefahren in einzelnen seiner Wirkungen bef. gegenüber der Respiration und Circulation und diese Gefahren — angefangen vom unangenehmen Erbrechen bis zum tödtlichen Ausgang — heißen uns vorsichtig zu Werke gehen bei der Narcofe, wir müssen stets auf der Lauer liegen gegen diesen unheimlichen Gegner, dessen Nahen so leicht zu übersehen und der, hat er uns einmal überrascht, so außerordentlich schwer siegreich zu bekämpfen ist.

Eine der gewöhnlichsten Complicationen der Chloroformirung ist das Erbrechen. Abgesehen davon, daß es bei Patienten mit gefülltem Magen eintritt, wird es in allen Stadien der Narcofe beobachtet; gleichwohl sind nur zwei Fälle bekannt, in denen durch Eindringen von Magen-Inhalt in die Luftwege Erstickungstod eintrat, indem nämlich die Kranken beim Erbrechen gewöhnlich erwachen. Wenn also auch nicht sehr gefährlich, bleibt es immerhin eine sehr unangenehme Begleitererscheinung, die nicht selten zu tagelang

andauernden Ueblichkeiten und fortwährendem Brech-Reiz führt.

Ernster schon ist das Auftreten großer psychischer Aufregung, das häufig combinirt ist mit heftigen clonischen und tonischen Krämpfen.

Sie sind sehr häufig bei Individuen zu beobachten, die unter chronischer Alcohol-Einwirkung stehen, die höchsten Grade indess findet man bei den hysterischen Frauenzimmern. Entschlummern wie Erwachen ist von heftigen Bewegungen, Schreien etc. begleitet, das sich bei Hysterischen bis zur tetanischen Streckung des Körpers, Verdrehung der Glieder, Umsichschlagen, heftigen Weinkrämpfen steigern kann.

Ungleich bedenklicher sind jedoch die üblen Zufälle, welche von Anomalien der Respiration ausgehen.

Unregelmäßige Respirationsbewegungen zu jeder Zeit der Narcoſe gehören zur Regel. Nicht selten kommt es schon im Beginne der Chloroformirung zu einem durch Reflex von den Trigeminasästen bedingten completeu Respirationsstillstand in Expirationsstellung des Zwerchfells, wahrscheinlich verbunden mit krampfhaften Verschluss der Stimmritze. Diese Apnoë, die fast immer von leichter Cyanose des Gesichts begleitet ist und bald kürzere bald längere Zeit dauert, auch wohl wiederholt sich einstellt, kann von selbst wieder verschwinden oder durch passende Eingriffe beseitigt werden. Gefährlicher schon ist der zur Zeit des sogenannten Excitationsstadiums auftretende Respirationsstillstand, der unter folgenden Erscheinungen auftritt:

Das Abdomen ist gespannt, brettartig hart sich anführend, unbeweglich, und auch am Thorax ist keine Spur von Bewegung sichtbar, fast immer ist starker Trismus vorhanden, so daß die Kiefer fest aneinander gepreßt sind, die Zunge ist durch tonischen Krampf ihrer Hebemuskeln gegen den weichen

Gaumen und die hintere Pharynx-Wand angedrängt, die Epiglottis dadurch nach unten und gegen die Giesbeckenknorpel angedrückt. Der auf diese Weise zu Stande gekommene Abschluß der obern Kehlkopfapertur ist natürlich von allen Symptomen gestörter Lungenventilation begleitet. Das ganze Gesicht röthet sich, die Lippen werden tiefblau, die Venen des Gesichts und Halses schwellen an, die Bulbi werden vorgetrieben, es ist mit einem Wort das erschreckende Bild mechanischer Erstickung in allen feinen Zügen vorhanden.

Auch in den späteren Stadien der Narcoſe, wenn der Chloroformirte unter der vollen Einwirkung des Anaestheticum ſteht und die Muskeln erſchlafft ſind, kann eine neue Gefahr durch Vermittlung der Zunge erwachſen, indem ſie bei dem horizontal gelagerten oder nach rückwärts geneigten Kranken dem Geſetz der Schwere folgend nach hinten ſinkt, den Kehldedeckel auf die Gieſskannen drückt und den Kehlkopf nach oben abſperrt. Auch dann werden die geſtörten Reſpirationsbewegungen und der Reſpirationsſtillſtand, ſowie die Färbung des Geſichtes und beſonders der Lippen auf dieſes leicht zu beſeitigende Reſpirationshinderniß aufmerkſam machen.»

Die größten Gefahren involviren jedoch diejenigen Anomalien, welche von den Circulationsorganen ausgehen; in allen Stadien der Chloroformirung, beſonders in dem der Toleranz, kommen ſie vor, plötzlich iſt ihr Erſcheinen, durch das der Patient, wenn auch nicht direkt dem Tode verfallen, ſo doch an den Rand des Grabes gebracht wird.

»Ohne Vorboten, gewöhnlich auch ohne Störungen der Reſpiration nimmt das Geſicht des Chloroformirten wie durch Zauberschlag eine cadaveröſe, wachsbleiche Farbe an, die Geſichtszüge verfallen, die Hornhaut verliert ihren Glanz und die bis zum Maximum erweiterten Pupillen ſind völlig reactionslos, der Unterkiefer ſinkt herab. Zu gleicher Zeit ver-

schwindet der Radialpuls und die Herztöne sind nicht mehr hörbar oder außerordentlich schwach. Eröffnete arterielle Gefäße bluten nicht mehr oder entleeren nur wenige Tropfen meist schwarzen Blutes. Mit dem Herzstillstand sind auch die Respirationsbewegungen ohne Cyanose und Dyspnoë verschwunden oder einige schnappende und seufzende Inspirationen überdauern das Cessiren des Herzschlages. Die Muskeln sind schlaff, die aufgehobenen Glieder fallen widerstandslos auf das Operationsbett zurück. Zuweilen unwillkürliche Stuhl- und Urinentleerung.«

Gelingt es nicht durch die später zu erwähnenden Mittel wieder regelmässige Respirations- wie Circulationsverhältnisse zu verschaffen, so erliegt der Patient dem Chloroformtod.

Kappeler hat in jüngster Zeit eine Tabelle von 101 Chloroformtodesfällen angefertigt, wobei, wenn möglich, constatirt ist:

Der Beobachter und der Ort der Publication — Geschlecht, Beruf, Alter, und Constitution der Patienten — vorhandene Krankheiten, welche die Gefahren der Chloroformirung vermehren — Operation oder Untersuchung, wegen welcher die Narcose eingeleitet wurde — Stadium der Narcose, in welchem der Chloroformirte starb — Menge des verbrauchten Chloroform und Methode der Chloroformirung — Erscheinungen, unter welchen der Tod eintrat — angewandte Wiederbelebungsversuche — Obductionsbefund — Bemerkungen (wie Aengstlichkeit, Stellung des Kranken, Bericht über früher eingeleitete Narcosen).

»Von den 101 Kranken dieser Tabelle, die während der Chloroformnarkose starben, gehören

78 dem männlichen,

22 dem weiblichen Geschlechte an,

bei 1 Falle ist dasselbe nicht constatirt.

Ueber das Alter gibt folgende Tabelle Aufschluß:

unter	5 Jahren	starben	2 (2 und 4 ^{1/2} Jahr)
von 5—15	«	«	12
« 16—30	«	«	19
« 31—45	«	«	21
« 46—60	«	«	25
über 60	«	«	1
nicht angegeben			21
			101

Die Operationen, wegen welcher chloroformirt wurde, waren:

Amputationen 20.

Der Finger und Zehen	9
des Vorderarms und Ellbogens	2
des Fusses	2
des Unterschenkels	2
des Oberschenkels	3
Nachamputation	1
Nicht näher bezeichnet	1
20	

Luxationen 11.

Des Daumens	1
des Vorderarmes	1
des Oberarms	7
des Oberfchenkels	2
II	

Geschwulstexstirpationen	8
Untersuchung von Verletzungen,	} 6
Einrichtung von Fracturen,	
Anlegung von Verbänden	

Uebertrag 14

Uebertrag	14
Operationen am männlichen Harn- und Geschlechtsapparat, (darunter 4 Cathete- rifikationen und 1 Castration)	8
Operationen an den weiblichen Geschlechts- organen (darunter 2 Ovariectomien) . . .	4
Operationen am Anus und Rectum . . .	4
Operationen an Hernien	2
Operationen wegen Necrose und Caries .	4
Lösung von Gelenkadhäsionen und forcirte Gelenkstreckung	4
Aetzung von Geschwüren	2
Eröffnung von Abscessen und Spaltung von Fistelgängen	6
Zahnextraktionen	6
Operationen am Auge	12
Nicht angegeben	4

 101

Modus der Inhalation:

Mittelft Tuch oder Lint	32
« Schwamm	4
« Papiertüte oder Tuchkonus	3
« Skinners Flanellmaske . . .	2
« Maske	1
« Esmarch's Korb	5
« Inhalationsapparat	2
« Metallinhalationsapparat, der freien Zutritt der Luft gestattet	2
« Clover's Inhalationsapparat.	5

 56

Nicht angegeben	45
---------------------------	----

 101

Ebenso ist nur in 46 Fällen die Menge des Chloroform angegeben; sie beträgt im Durchschnitt (die Drachme zu 4 gr. berechnet) 11,1 Gramm. Die kleinste Menge betrug 20 Tropfen, die größte 1—2 Unzen.

Wie lange nach Beginn der Inhalation der Tod erfolgte:

Unter 1 Minute	0
1—3 Minuten	5
3—5 „	2
6—15 „	10
nach 15 „	3
nicht angegeben	81
	101

Stadium der Narcoſe, in welchem der Tod eintrat:

Bei Beginn der Inhalation	4
Stadium der Aufregung	14
„ „ unvollständigen Narcoſe . .	25
in voller Narcoſe	30
„ „ „ nach vollendeter Operation	17
nicht angegeben	11
	101

oder

es starben:

vor der vollen Einwirkung des Chloroform	43
während voller „ „ „	47
nicht angegeben	11
	101.

In Hinblick auf die durch Kappeler's Tabelle feſtſtehenden Thatſache relativ häufiger Chloroformtodesfälle wird ſich jedem Leſer die Frage unwillkürlich aufdrängen: Wie führt denn das Chloroform den Tod herbei?

Indem ich abſehe von den Vertretern einer Chloroformidiosyncrasie, den Anhängern einer Annahme, die uns abſolut keinen Einblick in das Weſen der Chloroformvergiftung

gibt, in keiner Weise befriedigt und nur ein Nothbehelf ist«, und indem ich die manigfaltigen Hypothesen der einzelnen Forscher unberücksichtigt lasse, gehe ich zu den Ansichten derer über, die auf Grund genauer Prüfung von statistischen Tabellen über Chloroformtodesfälle zu ihrer diesbezüglichen Erklärung gekommen sind.

»Die Commission der Société médic. d'émulation spricht sich folgendermassen aus:

Der plötzlich eintretende Tod hängt ab von der Aufhebung der Function des Nervensystems. Dieses nimmt das anaesthetische Gift auf, es erlöschen die excitomotorischen Kräfte, dadurch erfolgt eine Aufhebung der Respiration, dann der Circulation und somit der Tod.

Nach Sanson findet der Chloroformtod auf 3erlei Weise statt:

- 1) durch Syncope: Der Tod ist entweder Folge des Verlusts der Irritabilität des Herzmuskels, d. h. das Herz wird bei der Obduction schlaff gefunden und das Blut ist durch alle Höhlen vertheilt, (Aehnlichkeit mit Tod durch Shok) — oder aber der Tod ist Folge eines tonischen Herzkrampfes, das Herz wird dabei stark contrahirt und leer gefunden.
- 2) durch Asphyxie: peripher bei schon bestehender Lungenkrankung — central durch Lähmung der Medulla oblongata.
- 3) durch Necraemie: eine falsche Mischung des circulirenden Blutes, die das Herz schwächt, die Irritabilität des Nervensystems herunter setzt und den Stoffwechsel in den Capillaren lahm legt.

C. I. Reeve nimmt an:

- 1) Es handelt sich um eine sehr gefährliche und eingreifende Operation.
- 2) Die Chloroformirten waren Potatoren.
- 3) Der Tod tritt durch Herzparalyse ein, hervorgerufen

- a) durch Inhalation zu concentrirter Dämpfe,
- b) durch zu heftige Irritation der peripherischen Nerven in Folge der sehr schmerzhaften Operation.
- 4) Das Chloroform ist in kunstwidriger Weise oder nachlässig angewendet worden.
- 5) Die zu Operirenden sind mit chronischen Herzkrankheiten behaftet.
- 6) Unerklärte Fälle.

Richardson nimmt 4 Arten des Chloroformtodes an.

- 1) Tod durch syncopale Apnoë, eintretend gleich in der ersten Minute der Inhalation, wo das Chloroform durch Reizung der peripherischen Nerven reflectorischen Stillstand der Respiration hervorruft. Dadurch Anhäufung von Kohlenäure im Blut, Reizung des Vagus durch das asphyxirte Blut und Herzstillstand.
- 2) Tod durch epileptiforme Syncope, wobei durch excessive Reizung des Sympathicus im Stadium der Muskelrigidität Contraction und Blutleere der Arterien, dagegen strotzende Blutüberfüllung des rechten Herzens, der Venen und Sinus zu Stande kommt. Gastrische und intestinale Reizung, Aufregung und Hysterie sind praedisponirende Momente.
- 3) Tod durch Herzparalyse im Stadium der Muskeler schlaffung auftreten. Unregelmäßigkeit der Herzaction kündigt die Gefahr an und der Tod erfolgt durch gleichzeitigen Stillstand der Circulation und Respiration.
- 4) Der Tod durch die heftige Depressio des Nervensystems in Folge des aufgenommenen Chloroform einerseits und der eingreifenden chirurgischen Operation (Shok) andererseits. Dieser Tod tritt namentlich ein bei Blutungen, sodann wenn der Kranke, was besonders bei kleinern Operationen der Fall ist, vor eingetretener Anaesthesie im Stadium der Aufregung operirt wird.

Kappeler hält die Annahme eines Chloroformtodes durch

Syncope d. h. die bedrohlichen Erscheinungen gehen vom Herzen aus und die Herzaction erlischt vor oder mit der Respiration, und eines Chloroformtodes durch Asphyxie, d. h. die bedrohlichen Erscheinungen gehen von der Respiration aus und die Respiration erlischt vor dem Aufhören der Herzaction, für berechtigt.

Dabei ist Asphyxie weder im Sinne der wörtlichen Uebersetzung: Pulslosigkeit, noch im Sinne Bichat's: Ueberladung des Blutes mit Kohlenäure zu nehmen.«

Bezüglich der in seiner Tabelle beschriebenen Todesfälle 7 Chloroformirter, die mit plötzlichem Verschwinden des Pulses, Blässe oder leichter Lividität des Gesichts und maximaler Erweiterung der Pupille, während die Respiration anfänglich noch unbeeinträchtigt war oder, ohne zu sistiren, Störungen zeigte oder endlich fast zu gleicher Zeit mit dem Puls verschwand, rasch zu Grunde gingen, bevor noch das Chloroform zur vollen Wirkung kam, glaubt Kappeler wenigstens theilweise in die Kategorie der noch nicht hinreichend aufgeklärten, schon vor der Anwendung des Chloroform bekannten plötzlichen Todesfälle stellen zu dürfen, wo der Tod kurz vor oder bei Beginn einer gröfsern oder kleineren Operation erfolgte.*) Bei den verlorenen Kranken, an denen eine schmerzhaft Operation

*) Simpson, der wiederholt die Gelegenheit gesucht hatte, die Zulässigkeit des Chloroform auch bei gröfseren Operationen zu beweisen, wurde von seinem Freunde Prof. Miller eingeladen, gelegentlich einer Herniotomie in Gegenwart bedeutender Aerzte Edinburgs das Chloroform zum ersten Male öffentlich anzuwenden. Alles war bereit, allein derjenige, der das Chloroform in den Operationsaal trug, stolperte, fiel und der ganze Inhalt der Flasche war unwiederbringlich verloren. Anderes Chloroform war nicht bei der Hand und die Operation mußte ohne solches gemacht werden. Beim ersten Hautschnitt collarbirte die Kranke und starb. (Hätte die Operirte wirklich Chloroform bekommen, es wäre vielleicht für die Zukunft dieses herrlichen Mittels geschehen gewesen.)

Cazenave berichtet von einem 40jährigen Manne, der amputirt werden sollte. Derselbe war dermaßen herabgestimmt, dafs man ihn nicht zu chloroformiren wagte, und überein kam, es scheinbar zu thun. Es wurde ein Tuch ohne Chloroform weit vom Gesichte vorgehalten. Patient hatte jedoch kaum

begonnen oder ausgeführt wurde, bevor die Chloroformirung bis zum Erlöschen der Reflexerregbarkeit gediehen war, nimmt Kappeler an, daß sie dem traumatischen Shok erlagen, zumal bei bedeutendem vorhergegangenen Blutverlust oder bei einem anderweitig geschwächten Individuum.

Die Syncopetodesfälle bei Beginn der Narcofe hält er für die Folge der Wirkung sehr concentrirter Chloroformdämpfe verbunden mit unvorsichtigem oder forcirtem Chloroformiren, da bekanntlich durch concentrirte Chloroformdämpfe auf dem Wege des Reflexes durch den Trigeminus und Vagus Stillstand der Herz- und Respirationsbewegungen herbeigeführt wird.

Die Fälle, in denen der Tod unter der vollen Einwirkung des Chloroform eintrat, erklärt er für Syncope als directe Chloroformwirkung auf den Organismus; denn die bedrohlichen Erscheinungen treten hier zu einer Zeit auf, wo der Patient allerdings noch in tiefer Narcofe, allein das Chloroform oft schon längere Zeit beseitigt war, nach vollendeter Operation, jedenfalls aber zu einer Zeit, wo das Einathmen concentrirter Dämpfe, wenn solches mit Grund subsumirt werden könnte, erfahrungsgemäß lange nicht mehr die gefährliche Wirkung hat wie beim Beginn der Narcofe. Bezüglich des Todes durch Asphyxie macht Kappeler aufmerksam, daß derselbe ebenfalls in unvollständiger Narcofe, wie in voller eintritt, jedoch der Tod durch Asphyxie in unvollständiger Narcofe von dem Syncope-Tod in unvollständiger Narcofe sich dadurch

4 Athemzüge gethan, als plötzlich die Respiration stockte und das Herz aufhörte zu schlagen. Der Unglückliche war todt.

Default zog bei einem Patienten, an welchem er die Lithotomie ausführen wollte, die Schnittlinie mit dem Fingernagel auf's Perinaeum, der Patient schrie plötzlich auf und war eine Leiche.

Chopart wollte bei einem nicht anaesthetisirten jungen Manne das Praeputium spalten; bei der ersten Berührung stürzte Patient todt nieder.

Garengot sah einen nicht narcotisirten Kranken todt zusammensinken, als er ihm eben ein Panaritium öffnen wollte etc. etc.

unterscheidet, daß bei der Syncope der Patient plötzlich todt zusammenfinkt, während bei der Asphyxie ein Stadium heftiger Excitation vorausgeht.

Bezüglich der allgemein als Complication einer Chloroformnarcofe sehr gefürchteten fettigen Entartung des Herzmuskels und des Alcoholismus — Zustände, denen die größte Schuld und Gefahr beigemessen wurde und wird, die für die unglücklichen Ereignisse verantwortlich gemacht wurden, seit die Aerzte durch die im Laufe der Zeit wachsende Zahl der Chloroformtodesfälle stutzig gemacht, die Erklärung dafür in der Person des Patienten selbst suchten — sei erwähnt:

Wahr ist, dass die Narcofe von Potatoren regelmässig auftretende Anomalien zeigt: An Stelle des gewöhnlich rasch verschwindenden Excitationsstadiums tritt ein lang dauerndes Stadium der größten Aufregung, der heftigsten Muskelaction und ist endlich die Erschlaffung eingetreten, so besteht große Neigung zu Collaps und comatoösen Zuständen. Daß aber die Procentzahl der Chloroformtodesfälle bei Potatoren eine größere ist, dafür ist auf statistischem Wege noch keineswegs der sichere Beweis geliefert. Was die fettige Degeneration betrifft, scheint es zwar sehr einleuchtend, daß ein derartig pathologisch veränderter Herzmuskel schneller erliegt als ein gesunder, allein »ein hinreichend klinisches Material ist nicht vorhanden, das diese aprioristische Vermuthung zur unumstößlichen Thatfache stempelte.«

Gerade zu gebannt von diesem Vorurtheile wurde bei allen Chloroformtodesfällen, wo sich Fettherz fand, der Tod diesem zugeschrieben, es war ein förmliches Fahnden nach bestehendem Fettherz in solchen Fällen, um das Chloroform und seine Anwendung zu entlasten, indem man oft minimalen Erkrankungen der Muskelfaser des Herzens eine Bedeutung zutheilte, die sie in der Wirklichkeit nicht haben. Man muß eben berücksichtigen, daß bei genauen Sectionen auf Grund mikroskopischer Untersuchung fettige Degeneration des Herzmuskels ungemein

häufig, unter den verschiedensten Umständen zur Beobachtung kommt und man dem Fettherz deshalb nur eine relative Gefahr beimeßsen darf.*)

Kappeler bemerkt dazu, daß von 16 Patienten, die dem Chloroformtod erlagen und bei denen man Fettherz nachträglich constatirte (doch nur 5 mal auf Grund mikroskopischer Untersuchung) 8 schon früher, zum Theil kurz vorher ohne jede gefährliche Erscheinung chloroformirt wurden, ferner, daß er bei 26 Amputationen, wegen Gangraena senilis ausgeführt, wo neben der Erkrankung des Arterienrohres und anderweitigen Herz-Erkrankungen 4 mal weit gediehene fettige Degeneration desselben durch Obduction und mikroskopische Untersuchung constatirt wurde, nicht in einem einzigen Fall beunruhigende Erscheinungen während der Chloroformirung auftraten, wie denn auch kein einziger Chloroformtodesfall in der Literatur verzeichnet ist, wo Gangraena senilis die Chloroformanwendung verlangte, obwohl »gerade beim senilen Brande die Herzmuskulatur sehr häufig atrophirt und fettig degenerirt ist.« (Virchow.)

Wiewohl nun, aus den bisherigen Auseinandersetzungen leicht ersichtlich, das Chloroform bei jeder Operation, wo es Anwendung findet schon an und für sich eine nicht zu unterschätzende Gefahr in sich schließt, so bleibt es doch zum Mindesten zweifelhaft, ob nicht früher vor Einführung desselben

*) Die Leichen Chloroformirter zeigen als einzigen constanten Befund das flüssige Blut und selbst das ist ein Leichenphaenomen, das dem Chloroformtod nicht eigenthümlich ist, sondern eine Erscheinung, die nach den Untersuchungen von Herrich und Popp vorzugsweise mit dem raschen Eintritt des Todes, gleichviel aus welchem Grunde, in Connex zu stehen scheint.

Der Chloroformgeruch der Leiche kann nicht als charakteristisch gelten, da Rokitansky im Hirn mancher Leichen einen chloroformähnlichen Geruch fand ohne vorausgegangene Chloroformvergiftung.

v. Recklinghausen fand bei der Autopsie dreier Chloroformtodesfälle in den größeren Venenstämmen und im Herzen Gasblasen, obwohl von Fäulniß oder Zersetzung keine Spur an der Leiche wahrzunehmen war.

in die medic. Praxis ebenso viele plötzliche Todesfälle durch Furcht und Schrecken, durch Operationsfhok und Erschöpfung während gröfserer Operationen vorgekommen find, als heut' zu Tage bei Anwendung des Chloroform durch daselbe.

Jedenfalls steht fest, dafs das Chloroform die Grenzen der operativen Chirurgie in ganz ungeahnter Weise erweitert und so manches dem Tode verfallene Leben gerettet hat und überdies ist dieses Mittel dadurch, dafs seit dessen Anwendung die früher gebotenen Rücksichten auf Dauer, Schmerzhaftigkeit und Schwierigkeit einer Operation gröfstentheils weggefallen find, recht eigentlich der Träger der conservativen Chirurgie und hat als solches in Bezug auf Lebensglück und Leistungsfähigkeit der Operirten der leidenden Menschheit schon ganz unschätzbare Dienste geleistet.«

Die Gefahren des Chloroform in Zahlen auszudrücken, ist unmöglich, da man weder die Zahl der seit Einführung des Chloroform in die Chirurgie vorgekommenen Chloroform-Todesfälle kennt, noch die Zahl der Narcosen von 1847 bis auf den heutigen Tag nur zu schätzen im Stande ist; auf Grund der in den letzten Kriegen gemachten Erfahrungen darf man auf 12—13 tausend Narcosen einen Todesfall rechnen.

Nachdem aber nun einmal mit dem Chloroform zahlreiche Gefahren verbunden find, die in Form von Respirations- und Circulationsstörungen nicht selten den Tod gebracht haben, gehe ich daran, die mögliche Beseitigung der üblen Zufälle zu besprechen.

In Hinsicht auf das Erbrechen ist es gerathen, Jeden zu chloroformirenden darauf aufmerksam zu machen, die letzten 6—8 Stunden vor der Narcofe keine festen Speisen zu sich zu nehmen. Zeigen sich Würgebewegungen, so hat man sofort den Oberkörper des Patienten in aufrechte Stellung zu bringen und den Kopf nach vorn überzuneigen.

In allen den Fällen, in welchen von Seite der Patienten

der unerträgliche Geruch des Chloroform als Ursache des Brech-Reizes angegeben wird, hat sich der Zusatz von ein paar Tropfen des *Oleum Caryophyllorum* als sehr praktisch bewährt, indem dadurch das Chloroform einen chocoladeähnlichen Geruch annimmt.

Handelt es sich um die Herstellung der unterbrochenen oder ganz erloschenen Respirationsbewegungen, so ist die künstliche Respiration einzuleiten, durch welche die natürliche Ventilation des Blutes unterstützt, dem Herzen und den Centren der Respiration chloroformärmeres Blut zugeführt wird. Zweckmäfsig gehen der künstlichen Respiration diejenigen Manipulationen voraus, welche die Hindernisse des freien Luft-Ein- und Austritts seitens der Zunge, des Velum und der Epiglottis im Wege stehen.

In dieser Hinsicht empfiehlt:

B. Howard: Die Elevation des Thorax und Rückwärtslenkung des Kopfes und Halses. Durch diesen Handgriff wird der Stützpunkt der bei der Rückenlage in der Narcoſe nach hinten gefallen Zunge von der hintern Wand des Pharynx auf den harten Gaumen oder auf die Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen verlegt, die hintere Pharynxwand wird nach rückwärts, die vordere nach vorwärts gezogen und so der frontale Durchmesser des Pharynx vergrößert, während der Naseneingang zu gleicher Zeit mehr direct über und in die Fortſetzung der Längsaxe des Pharynx gebracht wird. Durch das Anspannen der *Musculi sternothyreoidei* wird der Larynx nach abwärts und vorwärts geſtoſen und in dieſer Stellung fixirt. Die ſtarke Auf- und Rückwärtsbewegung des Unterkiefers hat zur Folge, daſs die *M. geniopharyngei*, *mylopharyngei* und die vordern Bänder des *Digaſtricus* ſich anſpannen, das Zungenbein und durch die *Ligamenta hyoepiglottica* die Epiglottis nach vorne ziehen und letztere vertical ſtellen. Durch die vorhin erwähnte Fixation des abwärts und vorwärts geſtoſenen Larynx Seitens der

gespannten M. sternothyreoides wird auch die Schilddrüseneinflection der M. thyropharyngei und thyropalatini nach abwärts und vorwärts gezogen und in dieser Stellung fixirt, es müssen fomit durch die Rückwärtsstreckung des Kopfes und Halses auch diese Muskeln angespannt und gestreckt werden, wodurch für den freien Luftzutritt zum Kehlkopf ein Raum zwischen Velum und hinterer Pharynxwand hergestellt wird.“

Heiberg empfiehlt das Lüften des Unterkiefers. »Man soll hinter dem liegenden Patienten stehen, die beiden Daumen auf die Symphyse des Unterkiefers aufsetzen, das 2te Glied der gebogenen Zeigefinger hinter den hinteren Rand der aufsteigenden Aeste des Unterkiefers drücken und denselben mit Kraft direct nach vorne ziehen.«

Kappeler führt die Lüftung des Unterkiefers in der Weise aus, daß er »vor dem Chloroformirten stehend die beiden Daumen dicht neben der Nase auf die vordere Wand der Oberkiefer aufsetzt und mit den hackenförmig gekrümmten zwei vorderen Phalangen der Zeigefinger den beiderseits hinter dem Winkel gefassten Unterkiefer nach vorne zieht. Durch das Vorziehen des Unterkiefers werden auch Zunge und Zungenbein nach vorn gezogen, der Kehldeckel folgt durch Anspannung der Lig. hyoepiglott. diesem Zuge, wird aufrecht gestellt.«

Howard schlägt ferner das Vorziehen der Zunge mit der Zungenzange vor.

Dazu bemerkt Kappeler auf Grund von Versuchen an Leichen, daß die Wirkung nur in dem Oeffnen des Pharynx besteht und der Kehldeckel auch bei starkem Vortreten der Zunge vor die Zahnreihen liegen bleibt oder kaum merklich nach vorn geschoben wird. Erst wenn der Zug so verstärkt wird, daß Unterkiefer und Zungenbein nach vorn gedrängt werden, stellt sich die Epiglottis auf.

Darum zieht

Kappeler die Zunge durch das Vorziehen des Zungenbeins mit vor, an dessen Körper er ein scharfes Häkcheneinhackt.

Besteht Kieferklemme, so rath

Hüter: Man führe den Zeigefinger zwischen der Wange und den Zahnreihen nach hinten bis zu den letzten Backzähnen, man schiebe die Spitze des Zeigefingers hinter den letzten Backzähnen zwischen die Kiefer ein und führe nun durch Senkung der Handwurzel eine hebelnde Bewegung aus, welche die Kieferklemme soweit beseitigt, daß man die Spitze desselben Zeigefingers sofort an die Basis der Zunge in die Vertiefung vor der Epiglottis nahe dem Lig. glossocpiglotticum, hackenförmig einsetzen, und die Zunge nach vorn drücken kann.« Dabei legt er auch Werth auf die schnelle Ausführungsmöglichkeit und den Vorzug, daß der Kitzel des Fingers an der Epiglottis einen respiratorischen Reiz ausübt.

Kappeler: »Bei Potatoren mit protrahirtem Aufregungsstadium und starker, anhaltender Retraction der Zunge ist dem wiederholten Vorziehen derselben, wobei trotz aller Vorsicht eine Verletzung oft nicht zu vermeiden ist, das Anschlingen mit einer durch die ganze Dicke gezogenen Fadenschlinge als sicheres und schonenderes Verfahren vorzuziehen.«

Kommt man mit den eben beschriebenen Manipulationen nicht zum Ziel, so gehe man sofort an die Einleitung der künstlichen Respiration, bezüglich derer uns verschiedene Methoden zur Verfügung stehen.

Die älteste und wohl gebräuchlichste Methode ist das Luft- einblasen von Mund zu Mund, oder mittelst elastischen Catheters, oder mittelst Blasebalg oder mittelst eines mit dem Blasebalg verbundenen und in den Larynx eingeführten Tubulus.

Die Methode von

Marshall Hall besteht in Folgendem: »Man legt den Chloroformirten, Nase und Mund freilassend, indem man die Stirne auf den rechtwinklig gebogenen Vorderarm bringt, platt auf den Bauch, dann drehen ihn 2 oder 3 Gehilfen gleichzeitig auf die Seite oder halb auf den Rücken, um ihn gleich nachher wieder auf den Bauch zu legen, wobei zugleich ein

Druck auf den Rücken ausgeübt wird. Dieses Drehen auf den Bauch und auf die Seite wird abwechselnd circa 15 mal in der Minute vorgenommen. Bei der Bauchlage fällt die Zunge nach vorn und durch die Körper schwere und den Druck im Rücken entsteht eine Verengerung des Thorax bei der Lagerung auf die Seite durch Entlastung eine Erweiterung des Thorax (Inspiration) so daß die Luft von selbst aus- und eintritt.«

Max Schüller rät: Während der Patient in horizontaler Rückenlage mit nicht erhöhtem Kopfe auf dem Bette liegt, greift der Arzt von oben her mit seinen beiden Händen unter den rechten und linken Rippenbogen, zieht dieselben kraftvoll in die Höhe und preßt sie dann wieder nach abwärts gegen die Bauchhöhle. Diese aufeinanderfolgenden Bewegungen haben in einem Tempo zu geschehen, welches dem natürlichen Rhythmus der Athembewegungen entspricht. Damit die Bauchdecke dauernd schlaff bleibe, ist ständige Huft-Kniebeuge erforderlich. Die Zunge muß dauernd aus dem Munde hervorgezogen werden.«

Silvester's Verfahren ist Folgendes: »Nach kräftigem Vorziehen der Zunge oder noch besser des Unterkiefers und nachdem Patient horizontal oder mit abwärts geneigtem Kopfe ausgestreckt worden, faßt der hinter dem Kopfe des Kranken stehende Operateur die im Ellenbogen flektirten Oberarme, drückt sie seitlich gegen die Brust, während zugleich die Schultern niedergedrückt werden; dann zieht er die gestreckten Arme mit kräftigem Zug über den Kopf in die Höhe, so daß die Rippen durch Anspannung der M. pectorales gehoben werden und fixirt sie etwa 2 Sekunden in dieser Lage. Dieses Senken, Flektiren und Andrücken der Arme, abwechselnd mit Strecken und Heben wird 15 mal oder öfter in der Minute wiederholt.«

Ziemssen »setzt 2 Electroden (durchfeuchtete, zolldicke Schwammkappen) eines Störcher'schen Inductionsapparates zu beiden Seiten des Halses über dem untern Ende des M. sca-

lenus antic., am äußern Rande des M. sternocleidomastoideus, den man etwas nach innen drängen soll, fest auf. Er beabsichtigt so, nicht nur den Phrenicus mit seinem Muskel, sondern auch andere Inspirationsmuskeln direct (M. scalenus antic., M. sternocleidomastoideus) oder ihre Nerven (des M. cucullaris, Levator scapulae, der M. pectorales, serrati, rhomboidei etc.) zu reizen, um möglichst tiefe Inspirationen zu erzielen. Die Dauer der einzelnen Reizung ist die einer ruhigen, tiefen Inspiration, d. h. etwa 2 Sekunden die Expiration wird durch Compression der obern Bauch- und untern Thorax-Partien unterstützt. Kopf, Schulterblatt und Oberarm werden fixirt.»

»Hat man Grund in der Chloroformasphyxie anzunehmen, daß der freie Lufteintritt oder Austritt durch den Larynx wegen Ansammlung von Schleim, Blut oder Blutgerinnsel am Kehlkopfeingang, wegen Narbenstricturen gehemmt sei, und gelingt auch die Einführung des Larynx catheters nicht, so muß die künstliche Respiration mit der Laryngo- oder Tracheotomie verbunden werden.«

»Von denjenigen Wiederbelebungsverfahren, die darauf ausgehen, die primär geschwächte oder erloschene Herzthätigkeit in der Chloroformsyncope anzuregen, ist wiederum die wichtigste die künstliche Respiration.

Handelt es sich nur um Pulslosigkeit bei, wenn auch geschwächten, doch fortdauernden Herzbewegungen, so ist ganz leicht denkbar, daß durch eine rasch und energisch eingeleitete Lungenventilation und die so mächtig beförderte Elimination des Chloroform bei noch erhaltenem Lungenkreislauf die erlahmende Herzthätigkeit durch Zufuhr von Blut, dessen Chloroformgehalt bei jeder Expiration abnimmt, neu angefaßt werden kann.

Bei schon erloschener Herzthätigkeit (und auch bei solcher sind schon Rettungen beobachtet worden) ist die künstliche Respiration, ähnlich wie beim Brechact, wohl nur auf mechanischem Wege wirksam, insofern sie durch Compression und

Erschütterung der Brustorgane und damit auch des Herzens die Bewegungen desselben wieder anregt.«

Die bei eingetretenem Herzstillstand früher angewandte Acupunctur und in neuerer Zeit versuchte Electropunctur ist, abgesehen von keinem einzigen bekannten Erfolge bei der Chloroformsyncope, aus der Therapie zu entfernen auf Grund der Erfahrungen Sigmund Meyer's, der durch die direkte elektrische Reizung des Säugethier-Herzens zu dem positiven Resultat kam, daß die Reizung des Herzens durch inducirte und constante Ströme ein reines Herzgift von eminent raschem und sichern Erfolg ist.

»Denjenigen Mitteln, die auf dem Wege des Reflexes die stillstehende Respiration wieder in Gang bringen und die erlahmende Herzthätigkeit anregen sollen, ist nur eine secundäre Stellung in der Therapie der Chloroformasphyxie oder -syncope einzuräumen, d. h. sie dienen nur zur Unterstützung der künstlichen Respiration und zur Festhaltung des durch sie erreichten Resultates, da ja bei allen schweren Formen von Chloroformasphyxie- oder syncope die Reflexerregbarkeit erloschen ist.«

Zum Schlusse sei noch die sogenannte Inversion d. h. derartige Lagerung des Kranken, dass der Kopf am tiefsten zu liegen kommt, als Wiederbelebungs mittel bei Chloroformsyncope erwähnt, die Nelaton zuerst empfahl und durch deren Anwendung schon mehrere schwere Chloroformsyncopen verschwanden und die betreffenden Patienten gerettet wurden. »Wenn also, um zu recapituliren, in der Chloroformnarcose gefahrdrohende Erscheinungen, wie sterteröse oder stockende und schnappende Respiration, Lividitact oder Blässe des Gesichts, plötzliche Erweiterung der Pupillen ohne Brechen und ohne Erwachen, Schwäche oder Unregelmäßigkeit des Pulses, plötzlicher Collaps auftreten, so muß das Chloroform sofort entfernt und

- 1) der Howard'sche Handgriff oder die Lüftung des

Unterkiefers oder das Vorziehen der Zunge, die Ausräumung des Rachens und das Aufstellen der Epiglottis mit dem Finger oder endlich das Vorziehen des Zungenbeins vorgenommen werden.

2) Kann damit die Gefahr nicht beseitigt werden, so ist der Chloroformirte in halb invertirte Stellung zu bringen und es muß, bei durch obige Manipulation weit offenem Larynx, die künstliche Respiration eingeleitet werden. Von den Methoden der künstlichen Respiration empfiehlt sich in erster Linie diejenige Silvesters oder dann die Insufflation mit Hülfe eines Laryncatheters, abwechselnd mit Compression des Thorax. Ist ein Inductionsapparat rasch bei der Hand, so kann die künstliche Respiration durch rhythmische Faradisation des N. phrenicus fortgesetzt werden.

Die künstliche Respiration soll in verzweifelten Fällen bis auf eine halbe Stunde ausgedehnt werden, da man selbst nach 20 Minuten dauernder, vergeblicher Anwendung derselben das Leben wiederkehren sah.

3) Hat man Grund anzunehmen, daß während der künstlichen Respiration der freie Ein- und Austritt der Luft durch den Larynx auf irgend eine Weise trotz der obenerwähnten Manipulationen gehindert sei, so verbindet man künstliche Respiration mit der Tracheotomie.

4) Während der künstlichen Respiration, aber ohne dieselbe einen Augenblick zu unterbrechen, kann ein Strahl kalten Wassers in's Gesicht, in die Nase oder auf die Zwerchfellgegend unter starkem Druck gespritzt von Nutzen sein. Daneben mag auch die methodische Friction der Extremitäten versucht werden.

5) Stellen sich Respirationsbewegungen ein, so wird zweckmäßig das erreichte Resultat durch Riechmittel, reizende Clystiere (Essig, Brandy mit Wasser) und wenn der Kranke wieder schlucken kann, durch innerlich gegebene Stimulantien zu erhalten und zu sichern gesucht.«

Nachdem ich nun vom Werth des Chloroform, seinen Gefahren sowie der Beseitigung derselben das Wichtigste besprochen habe, erübrigt es mir noch Indicationen und Contra-indicationen der Chloroformnarkose, ferner die nothwendigsten Vorichts-Mafsregeln in Kürze zu behandeln.

»Für schmerzhaft und langdauernde Operationen ist die Narkose nicht nur im humanen Sinne der Schmerzerparnis, sondern auch für die Ausführung der Operation selbst ein willkommenes Unterstützungs-Mittel; jedoch dem Verlangen der Kranken, dafs eine kleine, kurz dauernde Operation nur unter der Narkose vollzogen werden solle, mufs der Chirurg Widerstand leisten, weil die Lebensgefahr der Narkose uns zu einer gewissen Einschränkung ihrer Indicationen zwingt.«

Der Arzt mufs eben von Fall zu Fall entscheiden über die Zulässigkeit der Narkose in Rücksicht auf die Gesundheitsverhältnisse des betr. Patienten und die Art und Gröfse der Operation.

»Kinder- und Greisenalter geben absolut keine Contraindication; die Narkosen verlaufen meist sehr schön und ruhig. Ebenso wäre es unrecht wegen irgend eines beliebigen Blasens und Reibens im Herzen, wegen intermittirendem Pulse oder wegen Tuberkeln der Lunge die Narkose zu verbieten.«

Leichte Klappenfehler ohne bedeutende Stauungserscheinungen, chronische Lungen-Erkrankungen vertragen sich im Ganzen gut mit der Chloroformnarkose.

Bedeutende Erkrankungen der Klappenapparate des Herzens, hochgradige Erkrankungen des Gefäfsrohres und namentlich die Erkrankung des Herzmuskels — hier vor allem das Fethertz — sodann habituelle Neigung zu Ohnmachten, grofse Schwäche durch Blutverlust, bestehender Shok, Uraemie, Epilepsie verlangen bei der Chloroformirung die gröfste Voricht, wenn sie nicht — hierüber entscheidet die sorgfältige Abwägung aller Momente für und wider im einzelnen Falle — die Anwendung des Chloroform geradezu verbieten.«

Die Frage, ob es für die Prognose der Narcoſe von entſcheidendem Einflusse ſei mit einem Tuche oder dem Esmarchſchen Korbe einerſeits zu chloroformiren, andererseits mit den complicirteren Apparaten, beantworte ich dahin, daß ich ſage: ein nachweisbarer Unterſchied in dieſer Richtung beſteht abſolut nicht.

Die Freunde der complicirten Apparate heben zwar als beſondern Vortheil derſelben hervor, daß der Patient keine zu concentrirten Chloroformdämpfe einathmen müſſe, daß ferner das Gemisch von Chloroform und Luft ſtets, ſo lange die Narcoſe dauert, die gleiche Zuſammenſetzung habe.

Allein, abgeſehen davon, daß durch eine richtige Diſtanz des mit Chloroform getränkten Tuches, die erſt im weiteren Verlaufe verkleinert werden darf, eine Gefahr von Seite zu concentrirter Dämpfe unmöglich iſt und hinreichend Gelegenheit für den Zutritt atmosphäriſcher Luft beſteht, kann man eben mit Recht den Anhängern dieſer complicirten Apparate, ohne beſonders deren Unhandlichkeit und Koſtſpieligkeit hervorheben zu wollen, den gewichtigen Einwand entgegenhalten, daß dieſe Apparate bekanntermaßen und oft im wichtigſten Moment verſagen, daß Luft von ganz anderer Zuſammenſetzung als beabſichtigt inhalirt werden muß, daß bei langdauernden Operationen die Narcoſe oft kürzere oder längere Zeit unterbrochen werden muß, weil der Apparat neuer Füllung bedarf und daß ſchließlich die Aufmerkſamkeit des Chloroformirers, die ganz auf die Narcoſe concentrirt ſein ſoll, unter dem Vertrauen auf die vermeintliche Sicherheit des Apparates leidet.

Ja fürwahr, die Narcoſe erfordert gewiß die größte, peinlichſte Aufmerkſamkeit, um allen den einzelnen ſo nöthigen Vorſichtsmaßregeln gerecht werden zu können, die näher im Folgenden beſprochen werden:

»Bevor mit der Inhalation begonnen wird, muß man ſich ein klares Bild von dem allgemeinen Gefundheitszuſtand des zu Chloroformirenden zu verſchaffen ſuchen und die inneren Organe, zumal das Herz, einer genauen phyſikaliſchen Unter-

fuchung unterwerfen. Niemals follte ein Kranker mit vollem Magen chloroformirt werden, weil die Füllung defelben die Bewegungen des Zwerchfells hindert und faft immer Erbrechen mit den unangenehmen Nebenerfcheinungen der Unterbrechung und Verzögerung der Narcofe oder der Gefahr der Aspiration der erbrochenen Maffen in die Luftwege im Gefolge hat. Eine der Chloroformirung vorausgehende Entleerung des Darms dient ebenfalls der freien Action des Zwerchfelles. Bei collabirten oder durch Blutverluft reducirten Kranken können vor der Narcofe Reizmittel (Sherry, Champagner) verabreicht werden, die in allen andern Fällen wegen des regelmäfsigen Erbrechens contraindicirt find. Sodann ift für vollftändige Freiheit der Circulation und Respiration zu forgen. Enganliegende Kleidungsftücke: Halsbinden, Corfets, Bauchbinden, Strumpfbänder find aufzuknüpfen.*) Künftliche Gebiffe find herauszunehmen. Der obere Theil des Thorax muß entblösst werden, damit man jeder Zeit den Gang der Respiration überfehen kann. Ruhe in der Nähe des Kranken, Fernhaltung vieler Zufchauer beim Beginn der Narcofe vermindern das Unbehagen des Kranken und der Zufpruch, ruhig und langfam zu athmen, verfehlt felten feinen Zweck.

Da aus den Unterfuchungen Richardson's hervorgeht, daß die Diffufion anaefthefirender Dämpfe vom Luftdrucke und der Temperatur in der Weife abhängig ift, daß die zur completen Anaefthefirung und ebenfo zur Elimination des Anaeftheticum aus dem Organismus nöthige Zeiteinheit um fo größer ift, je geringer der Luftdruck und je niedriger die Temperatur, ja daß fogar die Narcofe bei fehr niedriger Temperatur ($+4,5^{\circ}\text{C.}$) nicht nur langfam, fondern mit unangenehmen Nebenerfcheinungen, wie Aufregung und Erbrechen, von Statten geht, fo follte die Temperatur des Zimmers, in dem ein Kranker chloroformirt wird, nie unter eine gewiffe Höhe (nach Richardson $18,3^{\circ}\text{C.}$) finfen und es follte auch

*) Giraudet konnte bei chloroformirten Kaninchen, Hunden, Vögeln durch bloffen Druck auf den Unterleib den Tod fehr befchleunigen.

nach Beendigung der Narcofe, zur Zeit des Erwachens und der Elimination des Anaestheticum, die rasche Abkühlung des Operationszimmers (durch Oeffnen von Fenstern und Thüren im Winter) ängstlich vermieden werden. Ebenso darf nach dem gleichen Autor die Luft des Operationszimmers nicht feucht sein, weil bei stark mit Wasserdampf geschwängelter Atmosphäre die Aufnahme von Chloroform in's Blut verzögert und auch die Wirkung eventuell nothwendiger Wiederbelebungs-Veruche abgeschwächt wird.«

Ferner soll die Narcofe vom Beginn bis zum vollständigen Erwachen von einem nur dazu verwendeten Chloroformirer geleitet und überwacht werden; allein man kann deshalb nicht dem Chloroformirer die ganze Verantwortung für die Narcofe aufbürden, sondern der Operateur muß auch einen Theil dieser Verantwortlichkeit übernehmen, da ihm gewiß in der Mehrzahl der Fälle die Operation gestattet, von Zeit zu Zeit die Färbung und den Ausdruck des Gesichts, sowie die Respiration zu überwachen und durch Fragen an den Chloroformirer über den Gang der Narcofe die ungetheilte Aufmerksamkeit desselben auf die Chloroformirung concentriren zu helfen.*)

*) »Ohne Drittperson zu chloroformiren ist gleich gefährlich für den Kranken wie für den Arzt; für den Kranken, weil beim Auftreten übler Zufälle die Assistenz für eine wirkfame Anwendung der Rettungsmittel fehlt, für den Arzt, weil er im Falle üblen Ausgangs keinen Zeugen für sein Verhalten während der Narcofe hat, und weil, wie die englische Chloroformstatistik zeigt, Aerzte, die weibliche Kranke ohne Zeugen chloroformirten, schon wiederholt crimineller Vergehen angeeschuldigt wurden.«

In Rücksicht auf den letzten Punkt sei die Thatfache erwähnt, daß die Wäsche chloroformirter Frauen und Mädchen beim Erwachen aus der Narcofe sehr häufig befleckt gefunden wird mit einer zäh schleimigen Flüssigkeit, makroskopisch männlichem Samen auffallend ähnlich.

Der unter dem weiblichen Geschlechte allgemein verbreiteten und durch den oben erwähnten Befund scheinbar begründeten Furcht eines geschlechtlichen Mißbrauchs seitens der Aerzte während der Narcofe ist in der Praxis Rechnung zu tragen und deshalb ein eigener Chloroformirer oder ein anderer Zeuge zur Narcofe beizuziehen.

Im Uebrigen ist längst constatirt, daß diese spermaähnliche Flüssigkeit

Der Chloroformirer selbst hat zunächst besonders zu achten auf:

1. »Die Pupillen und das Gesicht des Kranken.

Plötzliche Erweiterung der Pupillen, nachdem schon Myosis vorhanden war, die ferner nicht mit Brechbewegungen oder mit dem Erwachen des Kranken aus der Narcofe im Zusammenhange steht, ist ein äußerst gefährliches Symptom und verlangt die sofortige Unterbrechung der Narcofe.

Stärkere Cyanose des Gesichts hängt sehr oft mit mechanisch behinderter Respiration durch Krampf- oder Relaxationsretraction der Zunge zusammen und kann durch die oben erwähnten Manipulationen beseitigt werden, ohne daß die Narcofe unterbrochen werden müßte.

Plötzliches Erblaffen des Gesichts gehört zu den gefährlichsten Symptomen, erfordert die schnelle Entfernung des Chloroform-Korbes oder -Tuches.

2) Die Respiration.

Man bemerkt außerordentlich häufig im Beginn der Narcofe die totale willkürliche oder reflectorische Unterbrechung der Respirationsbewegungen. Oft hilft schon energisches Zuspreehen die gestörte Function wieder in Gang zu bringen oder das Entfernen der Nasenflügel vom Septum, wenn deren Aneinanderlage das Respirationshemmnis bildet. Führt dieses Mittel nicht zum gewünschten Ziele, so kann die rhythmische Compression der untern Thoraxpartien oder ein Strahl kalten Wassers auf's Epigastrium von Nutzen sein oder es hilft durch Reflexwirkung das rasche Vorziehen der Zunge. Zu jeder Zeit der Chloroformirung muß man sich bei stockender Respiration über die Stellung der Zunge auf's Genaueste informiren. Bei dem zuweilen auftretenden, äußerst heftigen und anhaltenden Räuspern und Reizhusten, der mitunter die ganze Narcofe in Frage stellt, leistet, wenn nicht eine starke Verdünnung der

lediglich Vaginalschleim ist und diese Secretion auf die der sexuellen Sphäre angehörigen Traumbilder der Narcotisirten zurückzuführen ist.

Chloroformdämpfe oder die vorübergehende Entfernung von Chloroformkorb- oder Tuch, oder plötzliche Verabreichung von größeren Gaben Abhilfe bringt, nur die subcutane Injection von Morphinum wirksame Dienste.

3) Der Puls ist bei aufgeregten Kranken und bei heftiger Muskelfspannung und Action an der Radialarterie oft schwer zu fühlen, weshalb ihn Sansom an der A. temporalis zu palpieren räth.

Jede auch die geringste Unregelmäßigkeit des Pulses gebietet die größte Vorsicht und bei aussetzendem oder sehr schwachem Pulse wird man das Chloroform sofort beseitigen.

Große Aengstlichkeit der Kranken vor der Narcose, ungewöhnlich starke Aufregung und Muskelfspannung während der Chloroformirung mahnt stets zu großer Wachsamkeit und dem Sträuben, den Abwehrbewegungen ist nur in so weit entgegen zu treten, als damit der Fortgang der Narcose gesichert ist. Die Behinderung jeder Bewegung, das gewaltsame Festhalten der Kranken steigert entschieden die Muskelfspannung und die Aufregung. Lässt man dagegen den Kranken möglichst frei, fixirt höchstens den Kopf etwas und hindert das beliebte Weggreifen des Korbes oder Tuches, chloroformirt dabei ruhig und vorsichtig weiter, so geht auch das Excitationsstadium rasch und gut vorüber.

Nicht genug ist zu empfehlen, worauf schon Chassaignac hingewiesen hatte, jede überflüssige Berührung und Untersuchung des Kranken vor Eintritt der Anaesthesie zu vermeiden.

Ist das Stadium der Toleranz*) erreicht, so besteht die

*) Eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, jede Operation im Stadium der Toleranz vorzunehmen, machen:

- 1) Die Tracheotomien,
- 2) „ Tonfillotomien,
- 3) „ Tenotomien,

indem bei den zwei erst erwähnten Operationen die Reflexerregbarkeit erhalten sein muß, auf daß der Patient noch im Stande allenfallsig hinablaufendes Blut auszuhusten, bei der Tenotomie aber die im Stadium der Toleranz erschlaffte Sehne ebenso viele Schwierigkeiten bereitet, als die im Excitationsstadium straff gespannte Sehne Vortheile für die Operation bietet.

Kunft des Chloroformirens darin, daselbe mit Fernhaltung aller bedrohlichen Erscheinungen durch rechtzeitige Entfernung des Chloroform und durch rechtzeitiges Wiedervorhalten desselben zu erhalten, so lange die Operation dauert. Bekanntlich ist im Gegensatz zum Aether die Wirkung des Chloroform sehr nachhaltig, so dafs man oft 5 und mehr Minuten das Chloroform entfernen kann, ohne dafs der Kranke aus der Narcofe erwacht.

Beim Erwachen selbst ist nicht gerade viel zu thun. Man bringt den Kranken möglichst rasch aus der Chloroformatmosphäre des Operationszimmers in ein gut gelüftetes und hinreichend erwärmtes Krankenzimmer.

War die Operation von langer Dauer und mit grossem Blutverlust verbunden, so stärkt man ihn mit einigen Löffeln guten Weines, mit Kaffee oder einer kräftigen Suppe. Bei heftigem Kopfschmerz und Erbrechen ist die absolute Ruhe und Verdunklung des Zimmers geboten. Eis innerlich, eine Eisblase auf den Magen, kleine Quantitäten Eischampagner leisten zuweilen gute Dienste.

Intensive, nach der Operation auftretende Schmerzen verlangen nicht selten die Darreichung kleiner Gaben Morphium oder eine subcutane Morphinjection.«

Aus all' diesen Ausführungen geht, wie ich bestimmt glaube, deutlich genug hervor, dafs das Chloroform zwar ein sehr schätzbares Narcoticum ist, bis jetzt unübertroffen in seinen vortheilhaften Wirkungen, die nach verschiedenen Richtungen hin unbefreitbar und segensvoll sind, — allein gewifs ebenso klar dürfte dem Leser geworden sein, dafs das Chloroform ein unheimliches Mittel ist und bleibt, dessen Gefahren gleich zahlreich wie bedenklich sind, weshalb so oft der Arzt dem Kranken in dessen höchst eigenem Interesse die fragliche Wohlthat der Narcofe versagen mufs. So ist es noch dem Eifer der unermüdlichen Forscher möglich und überlassen, im Interesse der Wissenschaft wie der leidenden Menschheit vor-

wärts zu dringen auf der Bahn ihres Strebens, bis sie das Ziel erreicht und die Welt beglückt haben mit einem Narcoticum, das allen unsern Wünschen entspricht und nicht wie das Chloroform auf der einen Hand uns völlige Schmerzlosigkeit anbietet, in der andern aber des Todes finstere Gewalten birgt.

Zum Schlusse ergreife ich freudig die Gelegenheit, meinem hochverdienten Lehrer, Herrn Geheimrath v. Nufsbaum für die gütige Unterstützung meinen wärmsten Dank abzustatten.

Hauptsächlich benützte Literatur.

Deutsche Chirurgie von Billroth und Luecke:

Kappeler: Anaesthetica.

Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie von Pitha und Billroth:

v. Nussbaum: Anaesthetica.

Volkman: Sammlung klinischer Vorträge:

W. Koch: Ueber das Chloroform und seine Anwendung in der Chirurgie.

Zeitschrift für Chirurgie:

Hueter: Ueber globulöse Stase und Embolie.

Witte: Einwirkung des Chloroform auf die Circulation.

Hueter: Grundriss der Chirurgie.

Kienningers: Werth der Chloroformnarcose, Inaugural-Dissertation, München
1881.
